

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Institut Technique des Cultures Maraîchères et Industrielles



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture du PERSIL

ITCMI 2010

	المعدنوس	
	PERSIL	
	PARSLEY	
Nom botanique	<i>Pétroselinum crispum</i>	
Famille:	<i>Ombellifères</i>	
Plante herbacée potagère, bisannuelle cultivée dans tous les pays du monde		

I - PLANTE

- Température optimale : 15 à 18°C.
- Nombre de graines au gramme : 600-800
- Longévité moyenne de la graine : 2 à 3 ans
- Faculté germinative : 75 à 80 % (le persil perd facilement sa faculté germinative).

II - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

- Persil commun : le plus cultivé en Algérie
- Persil à feuilles plates et parfumé.
- Persil frisé

III -EXIGENCES

- Aime les terres d'alluvions, riches en humus et en humidité du sol et les terres légères.
- Température : très exigeant en lumière, résiste au froid (-9°C)
- Redoute les gelées et la sécheresse
- pH : 5,5 à 6,8
- Sensible au sel.

V - ZONES DE PRODUCTION

Il est répandu dans toutes les régions d'Algérie (le climat doux du littoral lui convient le mieux).

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- Labour à 30 cm avant semis suivi d'un passage de rotation –
- Lit de semence de 10 cm.

6.1- SEMIS

semis se fait en lignes dans des cuvettes, espacées de 0,20 -0,25 m ou en lignes jumelées aux distances 0, 20 m x 0,60 m

- Dose : 1 ,5 à 3,5 kg de semences / ha

- Semis d'automne (septembre novembre)
d'hiver (janvier février)
- Semis printemps (avril)

6.2- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Binage, sarclage, désherbage

6.3- FERTILISATION

Plante épuisante

+ Fumure de fond

Fumure Organique : 30t / ha

Fumure Minérale: 100 unités de N/ ha

90 unités de P/ ha

90 unités de K / ha

+ Fumure d'entretien : 60 unités de N / ha en 03 apports (Chaque 3 semaines).



6.4 - IRRIGATION

Le persil ne supporte pas une humidité exagéré du sol (optimale du sol est de 80-85 %)

VII - PROTECTION SANITAIRE :

Puceron : →
Pyrimicarbe
Malathion
Methomyl



Mouche de la carotte : Cypermethrine
Vamidothion
Mancozebe


Septoriose du celeri : Manebe+Zinebe+Oxychl de cuivre

Cercosporose du persil : Benomyl
Thiophante methyl

VIII - RECOLTE

Manuelle 60 à 80 jours après le semis

Rendements : 2 à 3 t / ha.



FTV : LA CULTURE DU PERSIL (1 Ha)
RDT : 80 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- achat Semence	-	-	-	-	-	-	1,5 kg	2000	3000	3000
S/T				-	-	-	-	-	3000	3000
II. Travaux du sol										
- Fumier + engrais (NPK)	4	600	2400	8	500	4000	25 T	1200	30000	35200
							4 qx	6000	24000	24000
- Labour	1	600	600	8	500	4000				4600
- Disquage+hersage	0,5	600	300	4	500	2000				2300
- Passage fraise rotative	0,5	600	300	4	500	2000				2300
- Préparation planches	15	600	9000	-	-					9000
S/T	21		12600	24		12000			54000	78600
III. Plantation et entretien :										
- Pré irrigation	2	600	1200	-	-		-	-		1200
- Semis	10	600	6000	-	-		-	-		6000
- Irrigation	10	600	6000	-	-		4000 m3	4	16000	22000
- Démariage	4	600	2400	-	-					2400
- Traitement produits : insect	1	600	600	8	500	4000		-	15000	19600
S/T	27		16200	8		4000			31000	51200
IV. Récolte :										
- Récolte	20	600	12000							12000
-conditionnement	10	600	6000				20 kg ficelle	200	4000	10000
S/T	30		18000						4000	22000
Total Général	78		46800	32		16000			92000	154800